

Scheda: *Myrmica rubra*

Scritto da Luca

Bosetti

Giovedì 03 Marzo 2011 12:24 - Ultimo aggiornamento Martedì 15 Maggio 2012 23:11



Areale di distribuzione: Tutta l' Italia ed Europa in genere.

Nome scientifico: *Myrmica rubra*

Scheda: *Myrmica rubra*

Scritto da Luca

Bosetti

Giovedì 03 Marzo 2011 12:24 - Ultimo aggiornamento Martedì 15 Maggio 2012 23:11

Famiglia: *Formicidae*

Subfamily: *Myrmicinae*

Genere: *Myrmica*

Ginia: Poliginica. Spesso formicai separati di una stessa zona sono in realtà un'unica grande colonia.

Regina: 5-6 mm

Operaie: 3-5 mm - non sono presenti caste.

Alimentazione naturale: Melata, insetti e aracnidi di piccole e medie dimensioni.

Alimentazione artificiale: Miele o zucchero diluiti e insetti (vivi e morti) preferibilmente piccoli e medi e non corazzati.

Umidità: 40-60%

Temperatura: 18-25°C

Ibernazione: Necessaria.

Scheda: *Myrmica rubra*

Scritto da Luca

Bosetti

Giovedì 03 Marzo 2011 12:24 - Ultimo aggiornamento Martedì 15 Maggio 2012 23:11

Formicai in natura: Creano formicai preferibilmente nella terra, sotto pietre e vasi, meno comunemente in legni in decomposizione sul suolo.

Formicai artificiali: Gesso, gasbeton, ytong, sabbia e terra. Mantenere i nidi abbastanza umidi e freschi.

Difficoltà: Media. Può dare problemi a causa del bisogno di temperature non troppo caldi e umidità più elevata. temperature oltre i 27°C e climi secchi possono causare improvvise morie.

Indole: Combattive e territoriali sono munite di pungiglione e le loro punture sono molto dolorose.

Periodo di sciamatura: Solitamente ad Agosto.

Tipo di fondazione: Semiclaustrale. Le regine necessitano di alimentarsi e spesso escono per cacciare anche in fase di fondazione.

Myrmica rubra è una formica che vive in zone boschive ed ombreggiate con fitto sottobosco umido. Preferisce temperature fresche. E' di colore rosso/giallo e presenta dimorfismo colorimetrico tra giovani esemplari (gialli) e esemplari vecchi (marrone scuro). Le colonie naturali sono molto numerose (vantaggio derivante dalla natura poliginica della specie) e formicai di una stessa zona sono spesso un'unica grande colonia.

Sono abili cacciatrici e spesso, al banchetto, si uniscono direttamente anche le regine.

In cattività non danno grandi problemi, purchè si tenga la colonia al fresco e il nido ben bagnato. al riguardo sono meglio nidi in gesso che non in gasbeton e ytong.

E' facilmente confondibile con

Myrmica ruginodis, *Myrmica sabuleti*

e

Myrmica scabrinodis

. Tra le tre specie la *Myrmica rubra* è sicuramente la più aggressiva e quella con la puntura più dolorosa. Inoltre si adatta meno delle altre a climi caldi e secchi.

Scheda: *Myrmica rubra*

Scritto da Luca

Bosetti

Giovedì 03 Marzo 2011 12:24 - Ultimo aggiornamento Martedì 15 Maggio 2012 23:11

(Colonia di *Myrmica rubra* con larve)

